

## TAXONOMÍA:

Reino: [Animalia](#)  
Filum: [Chordata](#)  
Clase: [Aves](#)  
Orden: [Anseriformes](#)  
Familia: [Anatidae](#)  
Género: [Anas](#)  
Especie: [Anas Crecca](#)

Nombres asturianos: [Cerceta común](#)



## DESCRIPCIÓN:

Pato de pequeño tamaño, siendo de hecho este ínfimo tamaño su rasgo más característico, con unos 35 cm de longitud, una envergadura de entre 53-59 cm y un peso de 270-394 g. El pico es redondeado y las patas adaptadas para el agua. En cuanto a su color, el pico es de un tono pardo o marrón oscuro, a veces moteado o manchado de negruzco, mientras que las patas son de color gris. El iris es de un diámetro de 8 mm y de color castaño.

El macho adulto presenta un color predominantemente grisáceo, cierto color dorado bajo la cola, pecho moteado en color ante o marrón claro, y la cabeza (más vistosa) de un color castaño rojizo, con mancha verde oscura alrededor de los ojos bordeadas por una estrecha lista crema. En las hembras, la cabeza es marrón oscuro y sobre los ojos parece adivinarse una zona más clara a modo de franja superciliar, los carrillos y el cuello son más pálidos y están finamente rayados de pardo.

## CICLO VITAL:

De no ser presa de enfermedades, depredadores o cazadores, la cerceta común logra una longevidad de unos 10 a 15 años.

## HÁBITAT:

Como ave acuática es obvio imaginar que se desarrolla en torno a zonas con importantes masas de agua. Las lagunas cercanas a los árboles y con abundante vegetación acuática son un ejemplo de hábitat adecuado y preferentemente frecuentado por esta cerceta. Durante el periodo de nidificación vive en aguas someras con abundante vegetación, como por ejemplo bien podrían ser brezales o helechales. De hecho, como las plantas

forman parte de su dieta, podría decirse que en realidad siempre estarán presentes en su hábitat.

Construyen sus nidos en el suelo al abrigo de vegetación o arbustos, en plantaciones de tubérculos, o terrenos pantanosos entre la maleza, pudiendo situarse próximo al agua, aunque no es condición inamovible. En invierno se encuentra en un espectro más amplio de biotopos como pueden ser marismas, humedales, embalses o pantanos.

#### ALIMENTACIÓN:

Come tanto en el agua sumergiendo la cabeza para hallar la presa, como también "pastando" en las orillas, para lo que introduce el pico en el fango, rebuscando y dando así caza a los diferentes invertebrados que encuentra a su paso. Su alimentación consiste principalmente en hierbas, plantas y sus semillas, complementada con moluscos, larvas de insectos acuáticos y pequeños crustáceos. Es por tanto un pato omnívoro, que durante la primavera ingiere larvas, gusanos y crustáceos, durante el otoño generalmente se decanta por semillas o brotes, y durante el invierno se alimenta de presas acuáticas que caza sumergiendo la cabeza en el agua, como incluso pueden llegar a ser anfibios y peces de pequeño tamaño. En primavera se alimentan principalmente de larvas de insectos, crustáceos y gusanos, mientras que en otoño ingiere todo tipo de semillas, hierbas, brotes de halófilas y de macrófitos..

#### COSTUMBRES:

Presentan dimorfismo sexual, mostrando el macho un bello plumaje, característico por su resaltado "antifaz" verde, siendo mucho más vistoso que el de la hembra, de tonos apagados y poco llamativos. La cerceta común nidifica en el suelo no siempre cerca del agua, pero en un lugar bien escondido. La hembra es la encargada de su construcción, buscando un hoyo en la tierra que esté camuflado entre la maleza para pasar lo más inadvertido posible. El hoyo será forrado con plumón que la propia hembra se arranca del cuerpo, hojarasca, hierba y helechos

En cuanto a la puesta; presenta una sola puesta de 8 a 12 huevos entre abril y junio. La responsable de los huevos también es la hembra, que se encargará de incubarlos mientras que el macho la abandona y regresa al nido cuando nace el primer pichón. De este modo, incubará los huevos entre 21 y 23 días.

El huevo de esta ave presenta un tamaño de 41-50 x 30-35,5 mm, siendo de color crema o gris con tinte verdoso.

Al nacer las crías, serán alimentadas principalmente por la hembra, aunque el macho pueda contribuir en menor medida. No obstante los pollos dejan el nido al poco de nacer para seguir a la madre.


Aunque es un ave muy sociable, prefiere no mezclarse con otras especies de patos, permaneciendo sus bandos alejados del resto. La mayor actividad la suele desarrollar al anochecer.

#### DISTRIBUCIÓN / ABUNDANCIA:

Se reparten por todo tipo de zonas húmedas, aunque la mayoría selecciona positivamente las aguas dulces. En Murcia puede observarse principalmente en el invierno en embalses del interior, como el de Santomera, Quípar, etc., lagunas de

depuración de aguas, lagunas en desembocaduras de Ramblas, e incluso en el Mar Menor.

La cerceta común es principalmente invernante, proviniendo los ejemplares de Europa central y septentrional. Es un ave de distribución Paleártica, encontrándose en Norteamérica una subespecie de cerceta, que ellos consideran a nivel de especie.



<http://www.cictic.com/snid/srcfcmn.mp3>

Autor: Marcos Menéndez Fernández  
Grupo: B  
Curso: 2º